

INSTRUKCJA DLA PACJENTA

Lek MENSIL wskazany jest do stosowania u dorosłych mężczyzn (w wieku powyżej 18 lat) w leczeniu zaburzeń wzrodu (erekcji). Zaburzenia erekcji mogą mieć różne przyczyny, zarówno o podłożu psychogennym (np. stres, przemęczenie, lęki, zaburzenia depresyjne), jak i organicznym (w przebiegu chorób, nałogów, w następstwie przyjmowania leków). Rozpoznanie zaburzeń erekcji nie musi mieć trwałego charakteru. Zaburzenia erekcji mogą jednak świadczyć o rozwoju poważnych chorób układu sercowo-naczyniowego, nerwowego, cukrzycy czy chorób urologicznych. Uważa się je za jeden z najistotniejszych markerów (wskaźników) występowania choroby niedokrwiennej serca, która może prowadzić do zawału. Dlatego nigdy nie należy lekceważyć występujących objawów.

Aby ocenić czy może Pan zastosować lek MENSIL, należy skorzystać z poniższego narzędzia diagnostycznego.

1. Należy wypełnić poniższy kwestionariusz. Kwestionariusz zawiera pięć pytań, które pomogą rozpoznać ewentualne zaburzenia wzrodu i wskazać na potrzebę leczenia. Każde pytanie kwestionariusza opatrzone jest kilkoma odpowiedziami. Spośród odpowiedzi na każde pytanie należy wybrać tylko jedną – tę, która najlepiej określa Pańskie odczucie.

W ciągu ostatnich 4 tygodni:

	0	1	2	3	4	5
Jak ocenia Pan swoją pewność, że mógłby Pan mieć i utrzymać erekcję	Brak	Bardzo niska	Niska	Umiarkowana	Wysoka	Bardzo wysoka
	0	1	2	3	4	5
Jeśli erekcja wystąpiła w wyniku stymulacji seksualnej, jak często była nasiloną na tyle, że umożliwiała wprowadzenie prącia do pochwy partnerki?	Nie podejmowałem stosunków płciowych	Prawie nigdy lub nigdy	Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)	Czasami (mniej więcej co drugi raz)	Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)	Prawie zawsze lub zawsze
	0	1	2	3	4	5
Jak często w czasie stosunku seksualnego był Pan w stanie utrzymać erekcję po wprowadzeniu prącia do pochwy partnerki?	Nie podejmowałem stosunków płciowych	Prawie nigdy lub nigdy	Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)	Czasami (mniej więcej co drugi raz)	Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)	Prawie zawsze lub zawsze
	0	1	2	3	4	5
Jak trudno było Panu utrzymać erekcję do zakończenia stosunku płciowego?	Nie podejmowałem stosunków płciowych	Niezwycie trudno	Bardzo trudno	Trudno	Nieco trudno	Prawie zawsze nie miałem trudności
	0	1	2	3	4	5
Jeśli podejmował Pan stosunek seksualny, jak często dostarczył on Pana zadowolenia?	Nie podejmowałem stosunków płciowych	Prawie nigdy lub nigdy	Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)	Czasami (mniej więcej co drugi raz)	Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)	Prawie zawsze lub zawsze

UZYSKANY WYNIK (suma punktów)

Uzyskany wynik*	Interpretacja wyniku
22-25	Brak zaburzeń erekcji
17-21	Łagodne zaburzenia erekcji
12-16	Łagodne do umiarkowanych zaburzenia erekcji
8-11	Umiarkowane zaburzenia erekcji
5-7	Ciężkie zaburzenia erekcji

Wskazania do zastosowania leku Mensil

Brak wskazań do stosowania leku
Można zastosować lek Mensil, po uprzednim skorzystaniu z dołączonego narzędzia diagnostycznego.

* jeżeli nie podejmował Pan stosunków płciowych to na podstawie uzyskanego wyniku (0-5 punktów) nie można ocenić, czy występują u Pana zaburzenia erekcji, dlatego przed zastosowaniem leku Mensil konieczna jest konsultacja lekarska.

2. Jeżeli wynik uzyskany w kwestionariuszu potwierdził istnienie u Pana wskazań do stosowania leku Mensil i chciałby Pan go zastosować, to należy odpowiedzieć na poniższe pytania.

Czy ma Pan zdiagnozowane któreś z poniższych schorzeń?

	Tak/Nie wiem	Nie
Niestabilna choroba wieńcowa (dławica piersiowa, „ból w klatce piersiowej”)	☐	☐
Zawał serca przeżyty w ostatnich 6 miesiącach	☐	☐
Udar mózgu przeżyty w ostatnich 6 miesiącach	☐	☐
Marskość wątroby	☐	☐
Ciężka przewlekła choroba nerek	☐	☐
Aktywna choroba wrzodowa (w ostatnim tygodniu nasiliły się dolegliwości takie jak ból brzucha, nudności, wymioty)	☐	☐
Białaczka	☐	☐
Szpiczak mnogi	☐	☐
Ciężkie zaburzenia krzepnięcia (Choroba von Willebranda, hemofilia)	☐	☐
Zakażenie wirusem HIV	☐	☐
Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki	☐	☐
Neuropatia nerwu wzrokowego	☐	☐
Utrata wzroku w jednym oku z innego powodu niż uraz, jaskra, zaćma	☐	☐
Choroby prącia (znaczne skrzywienie prącia, choroba Peyroniego – włókniste stwardnienie członka)	☐	☐

Czy zaobserwował Pan któryś z poniższych objawów u siebie?

	Tak/Nie wiem	Nie
Bóle za mostkiem pojawiające się przy wysiłku bądź zdenerwowaniu, które wystąpiły w ciągu ostatnich 2 miesięcy	☐	☐
Codzienna aktywność fizyczna powoduje występowanie duszności, kołatania serca, bardzo szybko występującego zmęczenia	☐	☐
Często odczuwana nierówna praca serca	☐	☐
Zawroty głowy przy wstawianiu z pozycji siedzącej lub leżącej	☐	☐
Utraty przytomności lub omdlenia	☐	☐
Częste ciśnienie tętnicze poniżej 90/50 mmHg	☐	☐
Częste ciśnienia skurczowe powyżej 160/90 mmHg nawet przy stosowaniu leków na nadciśnienie	☐	☐

Czy stosuje Pan leki łagodzące objawy choroby wieńcowej?

	Tak/Nie wiem	Nie
Nitrogliceryna (Nitromint, Sustonit)	☐	☐
Izosorbid (Sorbonit, Effox, Effox long, Isosorbide mononitrate, Mono Mack depot, Mononit, Olicard)	☐	☐
Pentaerytrytol (Pentarythritol compositum, Galpent)	☐	☐
Molsidomina (Molsidominum)	☐	☐
Nikorandyl (Angecil, Nicorandil Dexcel Pharma)	☐	☐

Czy stosuje Pan riocyguat (Adempas) w leczeniu nadciśnienia płucnego ?

☐

☐

☐

Czy stosuje Pan środki uwalniające tlenek azotu, tzw. poppers?

☐

☐

☐

Czy przyjmuje Pan leki alfa-adrenolityczne stosowane z powodu rozrostu gruczołu krokowego lub wysokiego ciśnienia krwi, zawierające np. doksazosynę, prazosynę, terazosynę, tamsulozynę (np. Cardura, Doxar, Omnic, Kornam) ?

☐

☐

☐

Czy stosuje Pan inne leki wskazane w leczeniu zaburzeń erekcji ?

☐

☐

☐

ZAZNACZONE ODPOWIEDZI

Tak / Nie wiem

Nie

Jeśli udzielił Pan odpowiedzi TAK lub NIE WIEM na którekolwiek z powyższych pytań, to przed zastosowaniem leku MENSIL konieczna jest konsultacja z lekarzem!

Jeśli udzielił Pan wszystkich odpowiedzi NIE, może Pan stosować lek MENSIL po zapoznaniu się z ulotką dla pacjenta dołączoną do leku.